

Sveikatos priežiūros specialistų kontroliniai klausimai prieš pradedant skirti gydymą lenalidomidu vaisingoms moterims

Paciento informavimas	
Vardas, pavardė:	Gimimo data:
Konsultacija – kontrolinis klausimų sąrašas	įterpti ✓ arba „netaikytina“
Informuokite apie galimą teratogeninio poveikio riziką negimusiam kūdikiui.	
Informuokite, kad reikia naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą arba visiškai susilaikyti nuo lytinių santykių 4 savaites iki gydymo pradžios, vaisto vartojimo pertraukų metu, visu gydymo laikotarpiu ir dar 4 savaites užbaigus gydymą.	
Paašškinkite, kad nurodymų dėl kontracepcijos reikia laikytis net ir tuo atveju, jei moteriai pasireiškė amenorėja.	
Įsitikinkite, kad pacientė sugebės naudoti kontracepcijos priemones.	
Informuokite apie galimas nėštumo pasekmes bei būtinybę atsiradus nėštumo rizikai nutraukti gydymą ir nedelsiant kreiptis konsultacijos.	
Įsitikinkite, kad pacientė sutinka kas 4 savaites atlikti nėštumo testą, nebent bus patvirtinta kiaušintakių sterilizacija.	
Paašškinkite apie su lenalidomido vartojimu susijusius pavojus ir būtinas atsargumo priemones.	
Paašškinkite pacientei, kad vaisto negalima duoti niekam kitam.	
Nurodykite, kad nesuvalytas kapsules reikia grąžinti vaistininkui.	
Paašškinkite, kad per visą lenalidomido vartojimo laikotarpį ir dar savaitę po vaisto vartojimo nutraukimo negalima būti kraujo donoru.	
Paašškinkite apie tromboembolinių komplikacijų riziką ir galimą poreikį kaitis tromboembolinių komplikacijų profilaktikos vartojant lenalidomidą.	

Konsultacijos dėl kontracepcijos klausimų sąrašas	įterpti ✓ arba „netaikytina“
Reikalingas nukreipimas konsultacijai dėl kontracepcijos priemonių.	
Nukreipimas konsultacijai dėl kontracepcijos priemonių pateiktas.	
Konsultacija dėl kontracepcijos priemonių suteikta.	
Ar mažiausiai 4 savaites pacientei jau buvo taikomas vienas iš šių kontracepcijos metodų:	
☐ implantas	
☐ levonorgestrelį išskirianti gimdos sistema (IUS)	
☐ lytiniai santykiai tik su partneriu, kuriam atlikta vazektomija: vazektomijos rezultatas turi būti patvirtintas neigiamu spermos tyrimo rezultatu	
☐ medroksiprogesterono ilgalaikio poveikio injekcija	
☐ ovuliacijos slopinimu tik progesterono sudėtyje turinčiomis tabletėmis (t.y. dezogestrelis)	
☐ kiaušintakių sterilizacija	
☐ kitas (prašau nurodyti):	
☐ nėra	
Ar pacientė įsipareigoja visiškai ir nuolat susilaikyti gydymo lenalidomidu metu?	
Ar prieš pradėdant gydyti nėštumo testas yra neigiamas	☐ taip ☐ ne

GYDymo NEgALIMA PRADėti,**KOL PACIENTEI 4 SAVAITĖMS NEPARINKTAS VEIKSMINGAS NĖŠTUMO KONTROLĖS BŪDAS****ARBA****Ji NEĮSIPAREIGOJA VISIŠKAI SUSILAIKYTI NUO LYTINIŲ SANTYKIŲ BEI NEGAUTAS NEIGIAMAS NĖŠTUMO TESTO REZULTATAS.**

Formą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė	Data	Parašas

Apie tai, kaip G.L. Pharma GmbH naudoja asmeninius duomenis, galima rasti:

<https://gl-pharma.at/privacy-policy/>

Sveikatos priežiūros specialistų kontroliniai klausimai prieš pradedant skirti gydymą lenalidomidu vaikų **NEGALINČIOMS** turėti moterims

Paciento informavimas	
Vardas, pavardė:	Gimimo data:
Konsultacija – kontrolinis klausimų sąrašas	
	įterpti ✓ arba “netaikytina”
Informuokite apie galimą teratogeninio poveikio riziką negimusiam kūdikiui.	
Paašškinkite pacientei, kad vaisto negalima duoti niekam kitam.	
Nurodykite, kad nesuvertotas kapsules reikia grąžinti vaistininkui.	
Paašškinkite, kad per visą lenalidomido vartojimo laikotarpį ir dar savaitę po vaisto vartojimo nutraukimo negalima būti kraujo donoru.	
Paašškinkite apie su lenalidomido vartojimu susijusius pavojus ir būtinas atsargumo priemones.	
Paašškinkite apie tromboembolinių komplikacijų riziką ir galimą poreikį laikytis tromboembolinių komplikacijų profilaktikos vartojant lenalidomidą.	
Kad moteris būtų pripažinta NEGALINTI turėti vaikų, ji turi atitikti toliau išvardytus kriterijus	
☐ Amžius ≥ 50 metų ir natūrali amenorėja, trunkanti ≥ 1 metus. Amenorėja dėl vėžio gydymo arba žindymo metu neatmeta pastojimo galimybės.	
☐ Ankstyvas kiaušidžių nepakankamumas, kurį patvirtino specialistas ginekologas.	
☐ Abipusė salpingoovarektomija.	
☐ XY genotipas, Turnerio sindromas, gimdos agenezė.	
☐ Kita (prašau nurodyti):	

Formą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė	Data	Parašas

Apie tai, kaip G.L. Pharma GmbH naudoja asmeninius duomenis, galima rasti:

<https://gl-pharma.at/privacy-policy/>

Sveikatos priežiūros specialistų kontroliniai klausimai prieš pradedant skirti gydymą lenalidomidu vyrams

Paciento informavimas	
Vardas, pavardė:	Gimimo data:
Konsultacija – kontrolinis klausimų sąrašas	
	įterpti ✓ arba „netaikytina“
Informuokite apie galimą teratogeninio poveikio riziką negimusiam kūdikiui.	
Paašškinkite, kad per visą gydymo laikotarpį, sustabdžius vaisto vartojimą bei vieną savaitę po gydymo nutraukimo reikia naudoti prezervatyvą, jei partnerė gali pastoti.	
Paašškinkite pacientui, kad vaisto negalima duoti niekam kitam.	
Nurodykite, kad nesuvarstos kapsules reikia grąžinti vaistininkui.	
Paašškinkite, kad per visą lenalidomido vartojimo laikotarpį ir dar savaitę po vaisto vartojimo nutraukimo negalima būti kraujo donoru.	
Paašškinkite apie su lenalidomido vartojimu susijusius pavojus ir būtinas atsargumo priemones.	
Paašškinkite apie tromboembolinių komplikacijų riziką ir galimą poreikį kaitytis tromboembolinių komplikacijų profilaktikos vartojant lenalidomidą.	
Informuokite pacientą apie veiksmingus kontracepcijos metodus, kuriuos gali naudoti jo partnerė moteris	
Informuokite, kad jei jo partnerė pastoja tuo metu, kai jis vartojo lenalidomidą, arba netrukus po to, kai nustojo vartoti lenalidomidą, jis turėtų nedelsdamas pranešti savo gydančiam gydytojui ir rekomenduoti, kad partnerė būtų nukreipta teratologijos srityje dirbančio ir turinčio patyrimą gydytojo ištyrimui ir konsultacijai.	

Formą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė	Data	Parašas

Apie tai, kaip G.L. Pharma GmbH naudoja asmeninius duomenis, galima rasti:

<https://gl-pharma.at/privacy-policy/>