

Patienten-Erinnerungskarte für Patientinnen, die mit Fingolimod (Chantico® von GL®Pharma) behandelt werden

Bitte beachten Sie auch die Packungsbeilage, die Sie zu Ihrem Arzneimittel bekommen haben, sie enthält weitere Informationen.



Wenn Fingolimod während der Schwangerschaft eingenommen wird, besteht das Risiko, dass das ungeborene Baby geschädigt wird.

Fingolimod darf von schwangeren Frauen sowie Frauen und Mädchen im gebärfähigen Alter, die keine effektive Schwangerschaftsverhütung anwenden, nicht eingenommen werden.

Ihr Arzt wird Sie vor Behandlungsbeginn mit Fingolimod und regelmäßig danach über das Risiko von Fingolimod für das ungeborene Baby aufklären, um dieses Risiko möglichst gering zu halten.

Während der Behandlung mit Fingolimod und bis 2 Monate nach Beendigung der Einnahme muss eine zuverlässige Verhütungsmethode angewendet werden, um eine Schwangerschaft zu vermeiden.

Vor Beginn der Behandlung müssen Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter dem Arzt einen negativen Schwangerschaftstest vorweisen. Schwangerschaftstests müssen in regelmäßigen Abständen während der Behandlung wiederholt werden.

Da Fingolimod nach Absetzen der Behandlung noch für etwa 2 Monate im Körper verbleibt, müssen Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter während und für 2 Monate nach Absetzen der Behandlung eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über zuverlässige Verhütungsmethoden.

Benachrichtigen Sie sofort Ihren Arzt, falls Sie während der Behandlung mit Fingolimod schwanger werden, oder wenn Sie beabsichtigen schwanger zu werden. Die Behandlung mit Fingolimod muss dann abgebrochen werden.

Wenn Sie während der Behandlung mit Fingolimod schwanger werden, wird Ihr Arzt Sie zum Risiko für das ungeborene Kind beraten und die Auswirkungen auf die Schwangerschaft einschätzen.

Bitte informieren Sie sofort Ihren Arzt, falls Sie nach Beendigung der Behandlung eine Verschlechterung Ihrer Multiplen Sklerose bemerken.