

Chantico (fingolimod)

Karta przypominająca dla pacjentek dotycząca ciąży

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy również przeczytać ulotkę dla pacjenta dostarczoną przez lekarza.

Lek Chantico (fingolimod) jest przeciwwskazany w okresie ciąży oraz u kobiet i dziewcząt w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej antykoncepcji.

Podczas rozpoczynania leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu, lekarz prowadzący będzie informował Panią o ryzyku teratogennym (powodującym wady u nienarodzonego dziecka) i niezbędnych działaniach minimalizujących to ryzyko.

Podczas leczenia i przez 2 miesiące po przerwaniu leczenia, kobiety i dziewczęta w wieku rozrodczym nie mogą zajść w ciążę. Kobiety i dziewczęta w wieku rozrodczym proszone są o wykonanie testu ciążowego w celu upewnienia się, że nie są w ciąży, a wynik negatywny musi zostać zweryfikowany przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Testy ciążowe muszą być powtarzane w odpowiednich odstępach czasu.

Lekarz poinformuje Panią o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez dwa miesiące po jego zakończeniu. Należy porozmawiać z lekarzem o najskuteczniejszych metodach antykoncepcji dostępnych dla Pani.

Jeśli zajdzie Pani w ciążę lub jeśli chce Pani zajść w ciążę, należy omówić to z lekarzem, ponieważ leczenie fingolimodem musi zostać przerwane.

W przypadku ciąży lekarz udzieli Pani informacji. Lekarz udzieli Pani porady medycznej dotyczącej szkodliwego wpływu fingolimodu na płód oraz dokona oceny potencjalnych skutków leczenia.

Przerwanie leczenia fingolimodem może spowodować nawrót aktywności choroby. Lekarz zadecyduje, czy i jak należy monitorować Pani stan po zaprzestaniu stosowania fingolimodu.