

PATIENTENAUSWEIS

Rivahib® 10 mg - Filmtabletten



Wirkstoff: Rivaroxaban

- Tragen Sie diesen Ausweis immer bei sich.
- Zeigen Sie diesen Ausweis jedem Arzt oder Zahnarzt vor der Behandlung.

Information für den Arzt oder Apotheker:

- Der INR-Wert zur Bestimmung der antikoagulatorischen Wirkung von Rivahib®-Filmtabellen ist nicht aussagekräftig und sollte deshalb nicht angewendet werden.

Was sollte ich über Rivahib®-Filmtabellen wissen?

- Rivahib®-Filmtabellen verdünnen das Blut und schützen Sie so vor der Bildung gefährlicher Blutgerinnsel.
- Rivahib®-Filmtabellen müssen genau nach Anleitung Ihres Arztes eingenommen werden. Um einen optimalen Schutz vor Blutgerinnseln zu gewährleisten, lassen Sie niemals eine Dosis aus.
- Sie dürfen Rivahib®-Filmtabellen nicht absetzen, ohne vorher mit Ihrem Arzt gesprochen zu haben, da sich das Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln bei Ihnen erhöhen könnte.

- Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker über jedes andere Arzneimittel, das Sie zurzeit einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen einzunehmen, bevor Sie mit der Einnahme von Rivahib®-Filmtabellen beginnen.

- Informieren Sie Ihren Arzt vor jeder Operation und jedem invasiven Verfahren darüber, dass Sie Rivahib®-Filmtabellen einnehmen.

Wann sollte ich meinen Arzt oder Apotheker um Rat fragen?

Bei der Einnahme eines Blutgerinnungshemmers wie Rivahib®-Filmtabellen ist es wichtig, über die möglichen Nebenwirkungen Bescheid zu wissen.

Eine Blutung ist die am häufigsten auftretende Nebenwirkung. Beginnen Sie nicht mit der Einnahme von Rivahib®-Filmtabellen, wenn Sie wissen, dass bei Ihnen ein Blutungsrisiko besteht. Sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt darüber.

Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen folgende Anzeichen oder Symptome für eine Blutung bestehen:

- Schmerzen
- Schwellung oder Unwohlsein
- Kopfschmerzen, Schwindel oder Schwäche
- Ungewöhnliche blaue Flecken, Nasenbluten, Zahnschleichbluten, lang anhaltende oder sehr starke Blutungen aus Schnittwunden oder Verletzungen
- Eine Monatsblutung oder vaginale Blutung, die stärker ist als üblich
- Blut im Urin, der dadurch rötlich oder braun aussehen kann; rot oder schwarz gefärbter Stuhl
- Abhusten von Blut oder blutiges bzw. kaffeesatzartiges Erbrechen

Wie nehme ich Rivahib®-Filmtabellen ein?

Für einen optimalen Schutz

- können Rivahib® 10 mg-Filmtabellen unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden

Ich erhalte eine blutgerinnungshemmende Behandlung mit Rivahib®-Filmtabellen (Wirkstoff: Rivaroxaban).

Name:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Andere Medikamente / Erkrankungen:

Gewicht:

Bitte verständigen Sie im Notfall:

Name des Arztes:

Telefonnummer des Arztes:

Arztstempel:

Bitte verständigen Sie auch:

Name:

Telefonnummer:

Beziehung: