Es lietoju antikoagulantu Rivaroxaban G.L. Pharma (rivaroksabans).
Aš vartoju antikoagulianta Rivaroxaban G.L. Pharma (rivaroksabaną).
Mind ravitakse vere hüübimisvastase ravimiga Rivaroxaban G.L. Pharma (rivaroksabaan).

Vārds, uzvārds / Vardas, pavardė / Nimi:

Adrese / Adresas / Aadress:

Dzimšanas datums / Gim. data / Sünniaeg:

Svars / Svoris / Kehakaal:

Citas zāles/slimības / Kiti vaistai/būklės / Teised ravimid/haigused:

Ārkārtas situācijā lūdzu paziņot:
Skubos atveju praneškite:
Hädaolukorras palun teavitage:

Ārsta vārds / Gydytojo v., pavardė / Arsti nimi:

Ārsta tālrunis / Gydytojo tel. / Arsti telefon:

Ārsta zīmogs / Gydytojo antspaudas / Arsti kood:

Lūdzu zīnot arī:
Taip pat praneškite:
Palun teavitage ka:

Vārds, uzvārds / Vardas, pavardė / Nimi:

Tālrunis / Telefonas / Telefon:

Radniecības pakāpe / Giminystės ryšys / Seos selle inimesega:

Pharma code

Pacienta brīdinājuma kartīte
Paciento budrumo kortelė
Patsiendi hoiatuskaart

front side

Rivaroxaban G.L. Pharma
10 mg **15 mg** **20 mg**
apvalkotās tabletes/plėvele dengtos tabletės/õhukese polümeerikattega tabletid

rivaroxabanum 05.2025

back side

Pharma code

70 mm

140 mm

Kā jālieto Rivaroxaban G.L. Pharma?

LV

Lai nodrošinātu optimālu aizsardzību, Rivaroxaban G.L. Pharma

- 10 mg tabletes jālieto kopā ar ēdienu vai tukšā dūšā,
- 15 mg tablete jālieto kopā ar ēdienu,
- 20 mg tablete jālieto kopā ar ēdienu

Kas būtu jāzina par Rivaroxaban G.L. Pharma?

- Rivaroxaban G.L. Pharma šķidrina asinis, un tas novērš bīstamu asins recekļu (trombu) veidošanos.
- Rivaroxaban G.L. Pharma jālieto tieši tā, kā norādījis Jūsu ārsts. Lai nodrošinātu optimālu aizsardzību pret asins recekļu veidošanos, **nekad neizlaidiet devu.**
- Jūs nedrīkstat pārtraukt Rivaroxaban G.L. Pharma lietošanu, vispirms nekonsultējoties ar savu ārstu, jo var palielināties asins recekļu veidošanās risks.
- Pirms Rivaroxaban G.L. Pharma lietošanas pastāstiet savam veselības aprūpes speciālistam par visām zālēm, kuras šobrīd lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu sākt lietot.
- Pastāstiet savam veselības aprūpes speciālistam, ka lietojat Rivaroxaban G.L. Pharma pirms jebkādas ķirurģiskas vai invazīvas procedūras.

Kad jālūdz padoms veselības aprūpes speciālistam?

Lietojot asins šķidrinātāju, piemēram, Rivaroxaban G.L. Pharma, svarīgi ir zināt iespējamās blakusparādības. Asiņošana ir visbiežākā blakusparādība. Nesāciet Rivaroxaban G.L. Pharma lietošanu, ja Jūs zināt, ka Jums ir asiņošanas risks, vispirms nepārrunājot to ar savu ārstu. Nekavējoties pastāstiet veselības aprūpes speciālistam, ja novērojat kādu no sekojošām asiņošanas pazīmēm vai simptomiem:

- sāpes,
- pietūkums vai diskomforts,
- galvassāpes, reibonis vai vājums,
- neparastu zilumu veidošanās, deguna asiņošana, smaganu asiņošana, asiņošana no grieztām brūcēm, kas ilgi nepāriet,
- menstruācijas vai asiņošana no maksts, kas ir smagāka nekā parasti,
- asinis urīnā, kas var būt sārts vai brūns, sarkani vai melni izkārnījumi,
- asins atklepošana, asins vai kafijas biezumiem līdzīgas masas atvemšana.

Informācija veselības aprūpes speciālistam:

- INR nav piemērots Rivaroxaban G.L. Pharma antikoagulācijas aktivitātes noteikšanai un tāpēc to nevar izmantot šim mērķim.

- **Vienmēr nēsājiet šo kartīti līdzi.**
- **Uzrādiet šo kartīti vienmēr, apmeklējot ārstu vai zobārstu.**

52 mm

Kaip vartoti Rivaroxaban G.L. Pharma? LT

direction

Norint užtikrinti optimalią apsaugą, Rivaroxaban G.L. Pharma

- 10 mg tabletes galima vartoti valgio metu arba nevalgius;
- 15 mg tabletes reikia vartoti valgio metu;
- 20 mg tabletes reikia vartoti valgio metu.

Ką turėčiau žinoti apie Rivaroxaban G.L. Pharma?

- Rivaroxaban G.L. Pharma skystina kraują, o tai apsaugo nuo pavojingų kraujo krešulių susidarymo.
- Rivaroxaban G.L. Pharma reikia vartoti tiksliai kaip nurodė gydytojas. Kad geriausiai apsisaugoti nuo kraujo krešulių susidarymo, **niekada nepraleiskite dozės.**
- Negalima nustoti vartoti Rivaroxaban G.L. Pharma prieš tai nepasitarus su gydytoju, nes gali padidėti kraujo krešulių susidarymo rizika.
- Jeigu vartojate, neseniai vartojote ar ketinate pradėti vartoti kitų vaistų, prieš pradėdami vartoti Rivaroxaban G.L. Pharma apie tai pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui.
- Prieš atliekant bet kokią chirurginę ar invazinę procedūrą, savo sveikatos priežiūros specialistui pasakykite, kad vartojate Rivaroxaban G.L. Pharma.

Kada turėčiau kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą?

Vartojant kraują skystinantį vaistą Rivaroxaban G.L. Pharma, svarbu žinoti, koks yra jo šalutinis poveikis. Dažniausias šalutinis poveikis yra kraujavimas. Jei žinote, kad Jums yra kraujavimo rizika, negalima pradėti vartoti Rivaroxaban G.L. Pharma, prieš tai nepasitarus su gydytoju. Nedelsdami pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui, jeigu pasireiškia tokie kraujavimo požymiai arba simptomai:

- skausmas,
- tinimas arba nemalonus jausmas,
- galvos skausmas, svaigulys arba silpnumas,
- nejprastos mėlynės, kraujavimas iš nosies, kraujavimas iš dantenų, ilgai nepraeinantis kraujavimas įsipjovus,
- gausesnis nei įprastai mėnesinių kraujavimas arba kraujavimas iš makšties,
- kraujas šlapime, kuris gali būti rausvos arba rudos spalvos, raudonos arba juodos spalvos išmatos,
- kraujo atkosėjimas arba vėmimas krauju ar į kavos tirščius panašiu skrandžio turiniu.

Informacija sveikatos priežiūros specialistams:

- tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) reikšmių nustatyti nereikia, nes tai nėra patikimas tyrimo metodas Rivaroxaban G.L. Pharma antikoaguliaciniam aktyvumui įvertinti.

- **Visada turėkite šią kortelę.**
- **Parodykite šią kortelę kiekvienam gydytojui arba odontologui prieš paskiriant Jums gydymą.**

Kuidas ravimit Rivaroxaban G.L. Pharma võtta? EE

Optimaalse kaitse tagamiseks tuleb võtta Rivaroxaban G.L. Pharma

- 10 mg tablette koos toiduga või ilma;
- 15 mg tablette koos toiduga;
- 20 mg tablette koos toiduga.

Mida pean teadma ravimist Rivaroxaban G.L. Pharma?

- Rivaroxaban G.L. Pharma vedeldab verd, takistades teil ohtlike trombide (vereklompide) teket.
- Rivaroxaban G.L. Pharma't tuleb võtta täpselt arsti juhiste järgi. Optimaalse kaitse tagamiseks trombide vastu **ärge jätke kunagi annust vahele.**
- Ärge lõpetage Rivaroxaban G.L. Pharma võtmist enne oma arstiga nõu pidamata, sest teil võib trombide tekkerisk suureneda.
- Enne Rivaroxaban G.L. Pharma'ga ravi alustamist rääkige oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
- Rääkige oma arstile enne mis tahes kirurgilist või invasiivset protseduuri, et võtate Rivaroxaban G.L. Pharma't.

Millal pean konsulteerima oma arstiga?

Verd vedeldava ravimi, nagu Rivaroxaban G.L. Pharma võtmisel on oluline teada selle võimalikke kõrvaltoimeid. Kõige sagedasem kõrvaltoime on veritsus. Ärge alustage Rivaroxaban G.L. Pharma võtmist esmalt oma arstiga nõu pidamata, kui teate endal olevat ohtu veritsuseks. Rääkige kohe oma arstile, kui teil on veritsuse nähte või sümptomeid, näiteks:

- valu;
- turse või ebamugavustunne;
- peavalu, pööritustunne või nõrkus;
- ebatavalised verevalumid, ninaverejooksud, igemete veritsus, kauakestev veritsus haavadest;
- tavalisest rohkem menstruaalveritsus või veritsus tupest;
- veri uriinis, mis võib olla roosa või pruun; punane või must väljaheide;
- verköha või veriokse või kohvipaksu meenutav okse.

Teave tervishoiutöötajatele:

- INR-väärtusi ei tohi kasutada, sest need ei ole Rivaroxaban G.L. Pharma antikoagulantse toime mõõtmiseks usaldusväärsed.

- **Kandke seda kaarti endaga alati kaasas.**
- **Näidake seda kaarti igale arstile, kaasa arvatud hambaarstile enne ravi alustamist.**

PK62708BAL, Rivaroxaban G.L. Fta.

70 mm

45 mm

Präparatenamen/Stärke:
Rivaroxaban G.L.
Darreichungsform:
Filmtabletten

Art.-Nr.: PK62708BAL
Länder: Lettland / lv, Litauen / lt, Estland / ee
Format: 253 x 140 mm
Packmittelart: Patientenkarte
Produktion: Adalv / mt
Schrift: Waldenburg 7,5 – 15,0 Punkt
Druckfarben: Cyan • Magenta • Gelb • Schwarz
Korr.-Version: 6
Datum: 26.06.2025
Uhrzeit: 23:00:24